



الشراكة الطلابية

مشروع التثقيف الصحي Health Education Project

الصرير

الفحوصات اللازمة

- قياس نسبة الأكسجين وثنائي أكسيد الكربون في الدم.
- تنظير الجهاز التنفسي العلوي (البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية).
- أشعة مقطعية للصدر.
- قياس مستوى الأكسجين في الدم.
- أشعة سينية للرقبة والصدر.

العلاج

قد يحتاج المريض تنظير مجرى التنفس تحت التخدير الكامل للوصول إلى التشخيص أو إزالة جسم غريب وقد يحتاج المريض خزع الرغامى (فتحة في القصبة الهوائية للتنفس).
بعض الحالات تستدعي استخدام المضاد الحيوي والكورتيزون حتى تتحسن الحالة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.hep-ksu.info أو الاتصال بـ ٠١٤٧٨٦١٠٠ تحويلة: ١٤٢٢

إعداد:

صالح ناصر القرني

تصميم:

يوسف يعقوب الرشيدان

إشراف:

د. منال أحمد بخاري

أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود



الأسباب الشائعة

- قد يعاني الطفل من الصرير مباشرة بعد الولادة أو بعدها بفترة قليلة نتيجة إصابته بعيوب خلقية في مجرى التنفس مثل:
- انسداد فتحة الأنف الخلفية.
- تضخم اللوزتين.
- تليّن الحنجرة.
- التضيق الخلقى لمنطقة ما تحت المزمار.
- شلل الحبال الصوتية مثل الالتهابات.
- مرض الخناق أو الخانوق.
- التهاب لسان المزمار الحاد.
- التهاب الحنجرة والرغامى والقصبات.
- استنشاق مواد ضارة.
- وجود جسم غريب في مجرى التنفس.
- التهاب الحنجرة الحاد.
- بعد جراحات الرقبة.
- أورام في الحبال الصوتية.

متى تبحث عن استشارة طبية لدى طبيب متخصص؟

قد يكون الصرير علامة خطيرة تحتاج إلى زيارة الطوارئ؛ اتصل بالإسعاف أو اذهب إلى أقرب مركز صحي إذا كان هناك صرير طارئ غير مفسر السبب؛ خصوصاً لدى الأطفال.

ماذا سيحدث عند زيارتي للطبيب المتخصص؟

في الطوارئ، سيقوم الطبيب بفحص درجة حرارة المريض ومعدل نبضه وتنفسه وضغط الدم وربما يحتاج إلى إتباع طريقة يحاول استخلاص أي مواد غريبه في مجاري الهواء التنفسية لدى المريض إذا اشتبه بذلك. في الحالات الخطيرة ربما يقوم الطبيب بإدخال أنبوبة تنفس ليستطيع المريض التنفس بأمان.

للتنفس مرحلتين هما

شهيق حيث استنشاق الهواء إلى الرئتين، وزفير حيث إخراج الهواء من الرئتين، وخلال هذه المرحلتين يكون التنفس طبيعياً بدون أصوات كالصفير.

تعريفه

الصرير هو صوت غير طبيعي للتنفس، له إيقاع حادّ، وهو يشبه الصفير، سببه انسداد جزئي أو شبه كامل في الحلق أو الحنجرة. يسمع عادةً أثناء الشهيق أو الزفير أو كليهما.

نظرة عامة

يعتبر الأطفال أكثر عرضةً لانسداد الجهاز التنفسي العلوي (مدخل الأنف، التجويف الأنفي البلعومي، البلعوم، الحنجرة، القصبة الهوائية) وذلك بسبب ضيقها مقارنةً بها عند البالغين. وجود الصرير عند الأطفال يدل على وجود انسداد في الجهاز التنفسي العلوي وذلك يدعو إلى علاج عاجل لمنع تطور ذلك إلى انسداد كامل.

انسداد الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يحدث نتيجة وجود جسم غريب يسد مجرى التنفس العلوي، انتفاخ للأنسجة في الحلق أو أنسجة الجهاز التنفسي العلوي، أو تشنج لعضلات الجهاز التنفسي العلوي أو شلل الحبال الصوتية.