

عملية ازالة اللوزتين

تعليمات الخروج :



يستطيع المريض العودة الى المنزل بعد الافاقة الكامله من التخدير العام.

يبدأ المريض بأخذ وجبة خفيفة (كالسوائل) الى ان يتمكن من تناول الوجبة الغذائية الطبيعية وعليه الاكثار من السوائل وتجنب الأكل الحار واليابس والحامض لمدة اسبوعين.

من المتوقع وجود:

- افرازات لعابية دموية بكميات بسيطة في اول يومين.
- ألم خفيف في الحلق والأذن يصرف له مسكنات عند اللزوم.
- غشاء ابيض مصفر على مكان اللوزتين بعد مرور ١٢ ساعة (كما هو موضح في الصورة) وسوف يختفي بعد اسبوعين الى ٣ اسابيع.

على حسب حالتك قد يصرف لك :

- مضاد حيوي
- مسكنات الم يجب ان تؤخذ بانتظام قبل الوجبه بنصف ساعه.
- غسول مطهر للفم

عليك الابتعاد عن علاج الاسبرين والايبوبروفين لاحتمالية زيادة نسبة سيلان الدم في حالة حدوث نزيف.

يجب زيارة الطوارئ في الحالات التالية:

- حرارة مرتفعة تصل الى ٣٨,٥ درجة مئوية.
- صعوبة في النفس.
- صداع شديد او فقدان للشهية او غثيان او استرجاع.
- تعب وكسل عام.
- ألم شديد في الحلق لا يخف بالمسكنات.
- نزيف من الفم.

CONTACTS :

Phone: 0114786100

Wards Extension:

Ward 6A 1600

Ward 6B 1630

Ward 5B 1530

ENT Emergency 1112

