

عملية منظار الحنجرة

تعليمات الخروج :



يستطيع المريض العودة الى المنزل بعد الافاقة الكامله من التخدير العام في نفس اليوم او في اليوم التالي.

يبدأ المريض بأخذ وجبة خفيفة (كالسوائل) الى ان يتمكن من تناول الوجبة الغذائية الطبيعية.

من المتوقع وجود:

- ألم في الحلق وجفاف.
- افرازات لعابية دموية بكميات بسيطة لعدة ايام.
- ألم خفيف في الأذن يصرف له مسكنات عند اللزوم.

على حسب حالتك قد تحتاج الى :

- مضاد حيوي
- غسول مطهر للفم
- علاج لحموضة المعدة

يرجى الابتعاد عن :

- الصراخ والهمس (وقد يطلب منك إراحه الصوت بشكل تام لمدة ٣ ايام)
- السعال والنححة الكثيوة في اول اسبوعين.
- الاطعمة الحاره والحوامض والفلفل.

يجب زيارة الطوارئ في الحالات التالية:

- حرارة مرتفعة تصل الى ٣٨,٥ درجة مئوية.
- صعوبة في النفس.
- صداع شديد او فقدان للشهية او غثيان او استرجاع.
- ألم شديد في الحنجرة لا يتحسن بالمسكنات.
- نزيف من الفم
- عدم القدرة على البلع.

CONTACTS :

Phone: 0114786100

Wards Extension:

Ward 6A 1600

Ward 6B 1630

Ward 5B 1530

ENT Emergency 1112

